

適応癌腫	レジメン名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	
大腸がん	mFOLFOX6	オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間、同時投与	D1	14day	
		レボホリナート	200mg/m ²				
		フルオウラシル(drip)	400mg/m ²	急速静注			
		フルオウラシル(infusion)	2400mg/m ²	46時間			
	mFOLFOX6+B-mab	アバスチンor ペバシズマブ	5mg/kg	1回目 90分 2回目 60分 3回目以降 30分	D1	14day	
			オキサリプラチン	85mg/m ²			2時間、同時投与
			レボホリナート	200mg/m ²			
			フルオウラシル(drip)	400mg/m ²			急速静注
	mFOLFOX6+P-mab	ベクティビックス	6mg/kg	60分	D1	14day	
			オキサリプラチン	85mg/m ²			2時間、同時投与
			レボホリナート	200mg/m ²			
			フルオウラシル(drip)	400mg/m ²			急速静注
	mFOLFOX6+C-mab	アーピタックス	1回目 400mg/m ² 2回目以降 250mg/m ²	1回目 120分 2回目以降 60分	D1	14day	
			オキサリプラチン	85mg/m ²			2時間、同時投与
			レボホリナート	200mg/m ²			
			フルオウラシル(drip)	400mg/m ²			急速静注
	FOLFIRI	イリノテカン	150mg/m ²	2時間、同時投与	D1	14day	
			レボホリナート				200mg/m ²
			フルオウラシル(drip)	400mg/m ²			急速静注
			フルオウラシル(infusion)	2400mg/m ²			46時間
	FOLFIRI+B-mab	アバスチンor ペバシズマブ	5mg/kg	1回目 90分 2回目 60分 3回目以降 30分	D1	14day	
			イリノテカン	150mg/m ²			2時間、同時投与
			レボホリナート	200mg/m ²			
			フルオウラシル(drip)	400mg/m ²			急速静注
	FOLFIRI+P-mab	ベクティビックス	6mg/kg	60分	D1	14day	
			イリノテカン	150mg/m ²			2時間、同時投与
			レボホリナート	200mg/m ²			
			フルオウラシル(drip)	400mg/m ²			急速静注
	FOLFIRI+C-mab	アーピタックス	1回目 400mg/m ² 2回目以降 250mg/m ²	1回目 120分 2回目以降 60分	D1	14day	
			イリノテカン	150mg/m ²			2時間、同時投与
			レボホリナート	200mg/m ²			
			フルオウラシル(drip)	400mg/m ²			急速静注
	FOLFIRI+RAM	サイラムザ	8mg/kg	60分	D1	14day	
イリノテカン			150mg/m ²	2時間、同時投与			
レボホリナート			200mg/m ²				
フルオウラシル(drip)			400mg/m ²	急速静注			
FOLFIRI+ZAL	ザルトラップ	4mg/kg	60分	D1	14day		
		イリノテカン	150mg/m ²			2時間、同時投与	
		レボホリナート	200mg/m ²				
		フルオウラシル(drip)	400mg/m ²			急速静注	
TAS-102+B-mab	アバスチンor ペバシズマブ	5mg/kg	1回目 90分 2回目 60分 3回目以降 30分	D1,15	28day		
		ロンサーフ(p.o.)	70mg/m ²			(内服)	
CapeOX	オキサリプラチン	130mg/m ²	2時間	D1	21day		
		カペタビン(p.o.)	2000mg/m ²	(内服)			
SOX+B-mab	アバスチンor ペバシズマブ	7.5mg/kg	1回目 90分 2回目 60分 3回目以降 30分	D1	21day		
		S-1(p.o.)	80mg~120mg/day			(内服)	
		オキサリプラチン	130mg/m ²			2時間	