

適応癌腫	レジメン名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール
膵がん	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	D1,8,15	28day
	GEM+S-1	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	D1,8	21day
		S-1(p.o.)	80mg~120mg/day	(内服)	D1-14	
	GEM + nabPTX	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	D1,8,15	28day
		アブラキサン	125mg/m <sup>2</sup>	30分		
	GEM+Erlotinib	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	D1,8,15	28day
		タルセバ(p.o.)	100mg/Body	(内服)	D1-28	
	nal IRI+5FU/l-LV	オニバイド	70mg/m <sup>2</sup>	90分	D1,8,15	28day
		レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	2時間		
		フルオウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間	D1-28	
	FOLFIRINOX	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	2時間	D1	14day
		イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	2時間、同時投与		
		レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>			
		フルオウラシル(drip)	400mg/m <sup>2</sup>	急速静注		
フルオウラシル(infusion)		2400mg/m <sup>2</sup>	46時間			